

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 17.03.2006 / 5440

KULLANILACAKI BİTKİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Elma	Elma karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	30 g/100 L su	7 gün
	Elma küllemesi (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	40 g/100 L su	14 gün
	Elma depo hastalıkları (<i>Penicillium spp.</i> , <i>Botrytis cinerea</i> , <i>Monilinia fructigena</i>)	40 g/100 L su	14 gün
Armut	Armut karalekesi (<i>Venturia pirina</i>)	30 g/100 L su	7 gün
	Armut Memeli Pası (<i>Gymnosporangium fuscum</i>)	40 g/100 L su	14 gün
Ayva	Ayva Monilyası (<i>Sclerotinia linhartiana</i>)	50 g/100 L su	14 gün
Kayısı	Çiçek Monilyası (<i>Sclerotinia laxa</i>)	40 g/100 L su	14 gün
Şeftali	Çiçek Monilyası (<i>Sclerotinia laxa</i>)	40 g/100 L su	14 gün
Nektarin	Çiçek Monilyası (<i>Sclerotinia laxa</i>)	40 g/100 L su	14 gün
Kiraz/Vişne	Çiçek Monilyası (<i>Sclerotinia laxa</i>) Meyve Monilyası (<i>Monilinia fructigena</i>)	40 g/100 L su	7 gün
Antepfıstığı	Karazenk (<i>Pseudocercospora pistacina</i>)	50 g/100 L su	-
Nar	Kahverengi leke hastalığı (<i>Alternaria alternata</i>)	50 g/100 L su	-
Mandarin	Kahverengi leke hastalığı (<i>Alternaria alternata</i> f.sp. <i>citri</i>)	40 g/100 L su	7 gün
Nohut	Nohut antraknozu (<i>Ascochyta rabiei</i>)	50 g/da	10 gün

Koruyucu ve önleyici etkiye sahip, translamınar ve lokal-sistemik olarak taşınan bir fungusittir. Spor çimlenmesini, çimlenme tüpü ve misel gelişmesini, spor oluşumunu önler. Boscalid ile Pyraclostrobin'in etkileri birleştirilerek, iki farklı etki şekline sahip etkin madde içermesiyle direnç yönetimine ve IPM'e uygun bir ilaç olarak geliştirilmiştir.



Bellis®

Suda dağılılabilen granül (WG)

Grubu	7	11	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	---	----	-------------------------

% 25.2 Boscalid +% 12.8 Pyraclostrobin

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Net Miktarı : 0,5 kg e
Azami Perakende Satış Fiyatı:

1/3

İÇİNDEKİLER

Boscalid, Pyraclostrobin

ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ

Dikkat

ZARARLILIK İFADELERİ

H302 Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
H319 Ciddi göz hasarına neden olur.
H400 Sudaki organizmalar için çok toksiktir.
H410 Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için çok toksik.

ÖNLEM İFADELERİ

P264 Kullanım sonrası vücudun kirlenmiş kısımlarını iyice yıkayınız.
P280 Koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/maske kullanın.
P391 Döküntüyü bir araya toplayın
P501 İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yer üstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.



Eda Sardaş

Eda SARDAŞ

Ruhsatlandırma Uzmanı

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mersis No: 0143002384903015 Sicil No:103411-0

Barbaros Meh. Begonya Sk. Nidakule Ataşehir Bab

No:1 İç Kapı No: 48 34746 Ataşehir / İstanbul

Büyük Mükellefler V.D. 1430023849

22 Ekim 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE İÇİŞİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ**Elma karalekesi:**

- 1. uygulama:** Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
- 2. uygulama:** Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce)
- 3. uygulama:** Çiçek taç yapraklarının %70-80'i dökülünce
- 4. ve diğer uygulamalar** ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Armut karalekesi:

- 1. uygulama:** Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
- 2. uygulama:** Beyaz rozet döneminde
- 3. uygulama:** Çiçek taç yapraklarının %70-80'i dökülünce
- 4. ve diğer uygulamalar** ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Elma küllemesi:

- 1. uygulama:** Pembe çiçek tomurcuğu döneminde
- 2. uygulama:** Çiçek taç yapraklarının %60-70'i dökülünce
- 3. ve diğer uygulamalar:** Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece 12-14 gün aralıkla uygulamalara devam edilir.

Elma depo hastalıkları: Hasattan 14 gün önce tek ilaçlama yapılır.

Armut memeli pası:

- 1. uygulama:** Çiçek gözleri patlamak üzere iken
- 2. uygulama:** Beyaz rozet döneminde
- 3. uygulama:** Çiçek taç yapraklarının %80-90 döküldüğü devrede
- 4. ve diğer uygulamalar** ise ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Ayva monilyası:

- 1. uygulama:** Çiçeklerin %5 açtığı dönemde
- 2. uygulama:** Çiçeklerin %50' si açtığıında
- 3. uygulama:** Tam çiçeklenme döneminde yapılmalıdır.

**Bellis®****Suda dağılılabilen granül (WG)**

Grubu	7	11	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	---	----	----------------------------

% 25.2 Boscalid +% 12.8 Pyraclostrobin**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ**

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Ürünün bulaştığı giysileri çıkarın.

Solunursa; hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, tıbbi yardım isteyin.

Deri ile temas ederse; bol su ve sabun ile yıkayın.

Göz ile temas ederse; derhal etkilenen gözü birkaç dakika dikkatlice su ile yıkayın, varsa kontak lensleri çıkarın. Yıkamaya 15 dakika devam edin, bir göz doktoruna danışın.

Yutulursa; derhal ağzı su ile çalkalayın ve ardından 1-2 bardak su için, kendinizi iyi hissetmiyorsanız Zehir Merkezi'ne ya da doktora başvurun.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114**DEPOLAMA DURUMU**

Normal (serin ve kuru) depolarda ve kendi ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

Eda SARDAŞ

Ruhsatlandırma Uzmanı
BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mersis No: 0143002384800015 Sicil No: 103411-0
Barbaros Meh. Beyeçnyı Sk. Hıdakuale Ataşeni Eab
No:1 İç Kapı No: 48 34746 Ataşehir / İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 1420023649

22 Ekim 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Kayısı, Şeftali, Nektarin, Kiraz/Vişne çiçek monilyası:**1. uygulama:** Çiçeklenme başlangıcında (Çiçeklerin %5-10'u açtığında)**2. uygulama:** Tam çiçeklenmede (Çiçeklerin %90-100'ü açtığında) yapılmalıdır.**Kiraz/Vişne meyve monilyası:** Meyvelere ben düştüğünde tek bir ilaçlama yapılmalıdır.**Antepfıstığı karazenk:** İlk ilaçlama, hastalık belirtileri görüldüğünde çiçek dökümünden sonra, döllenmeyi takiben meyvelerin **nohut** tanesi büyüklüğüne ulaştığı devrede yapılmalıdır. Ekolojik koşullara ve hastalığın seyrine göre 14 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.**Nar kahverengi leke hastalığı:****1. uygulama:** Çiçek tomurcukları belirginleşmeye başladığı dönemde**2. uygulama:** Taç yapraklar döküldüğünde**3. uygulama:** Meyveler yarı büyüklüğe gelince yapılır.**Mandarin kahverengi leke hastalığı:** İlaçlamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişimi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvelerin hastalıktan korunması için 14 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir. İlaçlamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.**Nohut antraknozu:** İlaçlamaya ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle başlanır. Hastalık şiddeti ve iklim koşulları göz önüne alınarak 10 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilir.**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ**

Bellis® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 7/11 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Bellis®'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 7/11 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Eğer bir karışım yapılacaksa, ayrı bir kaptan önce karışım denemesi yapılmalıdır. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.

**Bellis®****Suda dağılılabilen granül (WG)**

Grubu	7	11	Fungisit (Mantar ilacı)

% 25.2 Boscalid +% 12.8 Pyraclostrobin**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114**

© BASF firmasının tescilli markasıdır.

ÜRETİCİ FİRMABASF SE Carl-Bosch-Strasse: 38
67056 Ludwigshafen/Almanya**ÜRETİM YERİ**S.T.I. Solfotecnica Italiana SpA,
Via Torricelli 2, Cotignola (RA), İtalya**RUHSAT SAHİBİ FİRMA**BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule
Ataşehir Batı No:1 D:48 34746 Ataşehir - İstanbul
Tel: 0216 5703400 Fax: 0216 5703779**Eda SARDAŞ**Ruhsatlandırma Uzmanı
BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: 0143002364900015 Sicil No:103411-0
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Batı
No:1 İç Kapı No: 48 34746 Ataşehir / İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 1430023649

22 Ekim 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR