

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 25.03.2014 / 9568

1/2



intervix® Plus

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANILACAGI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki veya Kullanım Alanının Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Kullanım Dozu
Clearfield Plus Ayciceği çeşitleri	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sırken (<i>Chenopodium album</i>) Seytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Çatal otu (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Dikenli yabani marul (<i>Lactuca serriola</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) Yeşil kirpi dan (<i>Setaria viridis</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Domuz pitrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	200 ml/da Ayciceğinin 4-6 gerçek yapraklı ve yabancı otların 2-4 yapraklı dönemlerinde
Yer fısıtı	Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Hakiki şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) Fener otu (<i>Physalis angulata</i>) Çoban değneği (<i>Polygonum bellardii</i>) Yabani turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>)	160 ml/da Çıkış sonrası Yabancı otların 2-4 yapraklı dönemlerinde
Fasulye	Kendi gelen arpa (<i>Hordeum vulgare</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Çoban değneği (<i>Polygonum bellardii</i>)	160 ml/da Çıkış sonrası Yabancı otların 2-4 yapraklı dönemlerinde
Bezelye	Çoban çantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Çoban değneği (<i>Polygonum bellardii</i>) Yabani turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Kuşotu (<i>Stellaria media</i>)	160 ml/da Çıkış sonrası Yabancı otların 2-4 yapraklı dönemlerinde
Soya	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Domuz pitrağı (<i>Xanthium strumarium</i>) Yeşil kirpi dan (<i>Setaria viridis</i>) Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sırken (<i>Chenopodium album</i>)	200 ml/da Çıkış sonrası Yabancı otların 2-4 yapraklı dönemlerinde
Yonca	Küküt (<i>Cuscuta spp.</i>)	200 ml/da Çıkış sonrası Yoncanın 8-10 yapraklı döneminde

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	2(B)	Herbisit (Yabancı ot ilacı)

25 g/L Imazamox

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMЕYİNİZ, SIGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- INSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMİR İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DİŞİNDÄ KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE 1/4'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

24 Eylül 2024

Net Miktarı: 1 L e
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER:
Imazamox

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ:
DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H411 Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için zehirlidir.
EUH208 Alerjik reaksiyona neden olabilir.

ÖNLEM İFADELERİ

- P102 Çocukları ulaşmayacakları yerde tutun.
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
P280 Koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/maske kullanın.
P391 Döküntüyü bir araya toplayın.
P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Clearfield Plus markalı olmayan ayciceği çeşitlerinde kesinlikle kullanmayın.
- Uygulama sırasında diğer kültür bitkilerine sıçratmayın ve sulama sularına bulaşmayın.
- Ayciceği bitkilerinin uygun büyümeye koşullarında uygulanmalıdır. Bitkilerin gelişmesine uygun olmayan düşük sıcaklık, aşırı nem veya kurak koşullarda uygulanmamalıdır.
- Uygulamalar yağışsız ve sakin günlerde yapılmalıdır.
- Tavsiye edilen dozlarla kullanıldığından kültür bitkilerine fitotoksik değildir.
- Boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayın.
- Doğrudan güneş ışığından ve sicakdan koruyunuz.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yer üstü su kaynaklarına bulaşmayın.
- Hedef dışı bitkilere ve alanlara sürüklemeyi önleyici tedbirler alınmalıdır.



Eda SARDAS

Ruhsatlandırma Uzmanı
BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: 0143002384900015 Sicil No: 103411-0
Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule Alaplılar Bab
No: 1 İç Kapı No: 48 34746 Alaplılar / İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 143C023049

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırma devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltın. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürme sistemini değiştirerek tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayın. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayın.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

İlaç, yabancı otların sap ve yapraklarından kolaylıkla emilir ve bitkinin her tarafına taşınır. Yabancı otların gelişmesini engeller ve 2-3 hafta içerisinde ölümlerine neden olur.

Clearfield Plus Aycıçeği çeşitleri, Yer fistığı, Fasulye, Bezelye, Soya ve Yoncada uygulama zamanı ve sekli: Kültür bitkilerinin erken dönemlerinde ve yabancı otların 2-4 gerçek yapraklı dönemlerinde, yoncanın 8-10 yapraklı döneminde uygulama yapılmalıdır. Uygulama yelpaze tipi püskürme yapan memeler kullanılmalı ve ilaçlama anında memeler kültür bitkisinin tepesinden 40-50 cm yüksekte olmalıdır. İlaç, damlacıklar otlar üzerinde kuruduktan sonra yağın yağmurla yıkanmaz. Uygulama döneminde hava sıcaklığının 10 °C üzerinde seyretmesi ilaçın etkinliğini artırır.

KULLANMADAN ÖNCЕ İYİCE ÇALKALAYINIZ.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

Intervix® Plus adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 2(B) olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Intervix® Plus'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayıza. Uygulamanın tekrarlanması gereği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip [Grup 2(B) harici] bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABILIRLIK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karışımı tavsiye edilmez.



Intervix® Plus

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	2(B)	Herbisit (Yabancı ot ilaçı)
-------	------	--------------------------------

25 g/L Imazamox

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMİLERİ:

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağrınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Solunursa; hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, tıbbi yardım isteyin.

Deri ile temas ederse; bol su ve sabun ile yıkayın.

Göz ile temas ederse; derhal etkilenen gözü gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akan su altında yıkayın.

Yutulursa; derhal ağızı su ile çalkalayın ve ardından 1-2 bardak su için, doktora başvurun.

ANTİDOTO VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

® BASF firmasının tescilli markasıdır.



DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı olabileceği zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

ÜRETİCİ FİRMA:

BASF Agrochemical Products B.V., Puerto Rico Branch Road #2, Km 47.3 Manati, PR 00674, ABD

ÜRETİM TESİSİ:

BASF Agri-Production S.A.S.
Port 7502, 7502 Route du Vieux Chemin de Loon
F59820 Gravelines, Fransa

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

BASF Türk Kırmızı San. ve Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule
Ataşehir Batı No:1 D:48 34746 Ataşehir - İstanbul
Tel: 0216 5703400 Fax: 0216 5703779

Eda SARDAS

Ruhsatlandırma Uzmanı

BASF Türk Kırmızı San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mersis No: 0143002384900015 Sicil No:103411-0

Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule Ataşehir Batı

No:1 İç Kapı No: 48 34746 Ataşehir / İstanbul

Büyük Mühendisler V.B. 1435023649