


İmal Tarihi :
 Son Kullanma Tarihi:
 Şarj No:
 Ruhsat Tarih ve Numarası: 29.05.2000 / 3778

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANILACAGI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki veya Kullanım Alanının Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Kullanım Dozu
Clearfield Aydıçığı Çeşitleri	Horozibiği (<i>Amaranthus albus</i>) Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Canavar otu (<i>Orobanche cernua</i>) Çobançığıneği (<i>Polygonum aviculare</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Domuz pitrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	125 ml/da Aydıçığının 4-8 gerçek yapraklı döneminde
Yonca	Küsküt (<i>Cuscuta spp.</i>)	125 ml/da Yoncanın 10-12 yapraklı döneminde
Bezelye	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Çobançığı (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Hakiki şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) Ballıbabası (<i>Lamium amplexicaule</i>) Çobançığıneği (<i>Polygonum aviculare</i> , <i>P. convolvulus</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) Kuş otu (<i>Stellaria media</i>) İsırğan otu (<i>Urtica urens</i>) Yavşan otu (<i>Veronica cymbalaria</i>) Domuz pitrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	100 ml/da Erken çıkış sonrası
Fasulye	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Çobançığıneği (<i>Polygonum aviculare</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Hakiki şahtere (<i>Fumaria spp.</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Domuz pitrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	100 ml/da Erken çıkış sonrası



Intervix® Pro

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	2(B)	Herbisit (Yabancı ot ilaçı)
		40 g/L Imazamox

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayın.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayın.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayın.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DİŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



Net Miktarı: 1 L e
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER:
Imazamox

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ:
DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

- H400 Sudaki organizmalar için çok toksiktir.
 H410 Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için çok toksik.
 EUH208 Alerjik reaksiyona neden olabilir.

ÖNLEM İFADELERİ:

- P280 Koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/maske kullanın.
 P391 Döküntüyü bir araya toplayın.
 P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.
 EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

Eda SARDAS

Ruhsatlandırma Uzmanı

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mersis No: 0143002364903015 Sicil No: 1C3411-0
 Barbares Mən. Sərgənyə Sil. Kəndkult. Alışqanlı Bah
 No: 1 İş Kvapı No: 4B-34746 Ataşehir / İstanbul
 Büyük Mükellefi V.D. 1430023649

30 Eylül 2024

5 7

Soya	Kırmızı kökülü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sütleğen (<i>Euphorbia spp.</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) Domuz pitrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	125 ml/da Erken çıkış sonrası
Yerfistiği	Dancan (<i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>E.colonum</i>) Hakiki şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>)	100 ml/da Erken çıkış sonrası
	Çobandeğeni (<i>Polygonum aviculare</i>) Çukurova fener otu (<i>Physalis angulata</i>) Domuz pitrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	125 ml/da Erken çıkış sonrası

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptı bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırma devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesi ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKINESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltın. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayın. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayın.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

İlac, yabancı otların sap ve yapraklarından kolaylıkla emilir ve bitkinin her tarafına taşınır. Yabancı otların gelişmesini engeller ve 3-4 hafta içerisinde ölümlerine neden olur.

Imidazolinone toleranslı Clearfield Ayçiçeği çeşitlerinde uygulama zamanı ve şekli: Temel problem Canavar otu ise, ayçiçeğinin 6-8 gerçek yapraklı döneminde; temel problem pitrak ve etikette belirtilen diğer yabancı otlar için ise 4-6 gerçek yapraklı döneminde yapılmalıdır. Uygulamada yelpaze tipi püskürme yapan memeler kullanılmalı ve ilaçlama anında memeler ayçiçeği bitkilerinin tepesinden 40-50 cm yüksekte olmalıdır. Dekara 20-30 litre su kullanılmalıdır. İlac, damlacıklar otlar üzerinde kuruduktan sonra yağan yağmurla yıkamaz. Uygulama döneminde hava sıcaklığının 10 °C üzerinde seyretmesi ilaçın etkinliğini artırır.



intervix® Pro

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	2(B)	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	------	--------------------------------

40 g/L Imazamox

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz. Ürünün bulaştığı gisileri çıkarın.

Solunursa; hastayı sakınleştirin, açık havaya çıkarın.

Deri ile temas ederse; bol su ve sabun ile yıkayın. Ürünün bulaştığı gisileri çıkarın.

Göz ile temas ederse; derhal etkilenen gözü gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akar su altında yıkayın.

Yutulursa; derhal ağızı su ile çalkalayın ve ardından bol su için.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidot yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere göre tedavi uygulanır.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Clearfield markali olmayan ayçiçeği çeşitlerinde kesinlikle kullanmayın.
- Uygulama sırasında diğer kültür bitkilerine sıçratmayın ve sulama sularına bulaştırmayınız.
- Ayçiçeği bitkilerinin uygun büyümeye koşullarında uygulanmalıdır. Bitkilerin gelişmesine uygun olmayan düşük sıcaklık, aşırı nem veya kurak koşullarda uygulanmamalıdır.
- İklim ve toprak koşullarının uygun gitmediği dönemlerde herbisit uygulamaları sararma vb görüntüler oluşturabilemektedir. Bu tür belirtiler normal olup, kısa sürede ortadan kalkar.
- Uygulamalar yağsız ve sakin günlerde yapılmalıdır.
- Tavsiye edilen dozarda kullanıldığından kültür bitkilerine fitotoksik değildir.
- Boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayın.
- Doğrudan güneş ışığından ve sicakta koruyunuz.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yer üstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fizikal, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı olabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



Eda Sardaş

Ruhsatlandırma Uzmanı
BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mersis No: 014300238490015 Sicil No: 103411-0
Barbaros Mah. Derganya S. N. Nida Külli Ataç Mah. 1. Blok
No:1 İç Kapı No: 48 34776 Ataşehir / İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 1430023849

30 Eylül 2024

DİRENÇ YÖNETİMİ:

Intervix® Pro adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 2(B) olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Intervix® Pro' nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 2(B) harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.

**Intervix® Pro****Suda Çözünen Konsantre (SL)**

Grubu	2(B)	Herbisit (Yabancı ot ilaçı)
--------------	-------------	--

40 g/L Imazamox**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114**

® BASF firmasının tescilli markasıdır.

ÜRETİCİ FİRMA:

BASF Agrochemical Products B.V., Puerto Rico Branch Road #2;
Km 47.3 Manatı, PR 00674, ABD

ÜRETİM YERİ:

BASF Agri Production S.A.S, 7502 Route du Vieux Chemin de
Loon F59820 Gravelines / Fransa

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule
Ataşehir Bab No:1 D:48 34746 Ataşehir - İstanbul
Tel: 0216 5703400 Fax: 0216 5703779

Eda SARDAS

Ruhsatlandırma Uzmanı
BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: J142002354900015 Sicil No: 103411-0
Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule Ataşehir Bab
No:1 İç Kapı No: 48 34746 Ataşehir / İstanbul
Büyük Mükefifler V.D. 1430023849

MİLYUM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEĞERLENDİRME VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

**30 Eylül 2024**

5. 2