

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 05.09.2011 / 8391

1/3

KULLANILACAGI BITKI ve ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Domates (Sera)	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	80 ml/100 L su	1 gün
Hiyar (Sera)	Kabakgillerde Mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	80 ml/100 L su	1 gün
Kornişon (Sera)	Kabakgillerde Mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	80 ml/100 L su	1 gün
Domates (Sera)	Çökerten ve Fide Kök Çürüklüğü (<i>Pythium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)	100 ml/da	1 gün
Biber (Sera)	Çökerten ve Fide Kök Çürüklüğü (<i>Phytophthora spp.</i>)	100 ml/da	1 gün
Patates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	80 ml/da	1 gün
Soğan	Mildiyö (<i>Peronospora destructor</i>)	80 ml/da	7 gün
Marul	Mildiyö (<i>Bremia lactucae</i>)	80 ml/da	1 gün
Ispanak	Mildiyö (<i>Peronospora farinosa f.sp. spinaciae</i>)	80 ml/da	7 gün
Bağ*	Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	100 ml/100 L su	10 gün
Kavun	Kabakgillerde Mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	80 ml/da	1 gün

"Bağ yaprağı hasadı yapılan bağ alanlarında kullanılamaz."

Orvego®; koruyucu ve tedavi edici özellikle olup bitki içerisinde translaminar ve lokal sistemik olarak taşınır.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcıları çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemeye devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

S, ③
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MİLYONELİ
12 Eylül 2024

12 Eylül 2024



Orvego®

Süsponsiyon Konsantre (SC)

Grubu	C8:45	H5:40	Fungisit (Mantar ilaç)

300 g/l Ametoctradin + 225 g/l Dimethomorph

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayın.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayın.
- Bitki koruma ürünü uygulamamış sahaya bir gün insan ve hayvan sokmayın.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajlarının $\frac{1}{4}$ 'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik.

Net Miktarı : 1 L e
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER
Ametoctradin, Dimethomorph

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ
Tehlike

ZARARLILIK İFADELERİ

- H302 Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
H317 Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.
H360f Doğurganlığa zarar verebilir.
H410 Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için çok toksik.

ÖNLEM İFADELERİ

- P261 Sis veya buhar veya spreyi solumaktan kaçının.
P264 Kullanım sonrası vücutundan kırılmış kışımlığını iyice yıkayınız.
P272 Kontamine olmuş giysilerin çalışma alanı dışına ıçmasına izin verilmemelidir.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/koruyucu gözlük veya maske kullanın.
P391 Döküntüyü biraraya toplayın.
P501 İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



Eda SARDAŞ
Ruhsatlandırma Uzmanı

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: 014300238490015 Sicil No: 103411-0
Barbaros Mah. Begonya Sk. Nişakule Ataşehir Bab
No: 1 İç Kapı No: 48 34746 Ataşehir / İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 1430023849

Damlalı sulama için: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Tankın deposu yarıya kadar suyla doldurulur, hazırlanan karışım tanka ilave edilir. Karıştırma devam edilerek tank hesaplanan su miktarına tamamlanır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Damlalı sisteminin kalibrasyonu: Damlalı sisteminin kalibrasyonu için baştan ve sondan 3 meme 1 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma %10'u geçmemelidir. Dekara verilecek BKÜ için gerekli su miktarı belirlenir.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayın.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ

Bağ mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm boy'a ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar hasatlığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Soğan mildiyö: Günlük ortalama sıcaklığın 16°C'ye ulaşması ve orantılı nemin %80'i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile ilaçlamalara başlanabilir.

Kavun, Hıyar (sera) ve Kornişon (sera) kabakgillerde mildiyö: İlaçlamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. İlaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Domates (sera) mildiyö: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmESİyle veya hastalığın her yil çıktıığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Patates mildiyö: Hastalık çıktı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmESİ ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlama tekrarlanır.

Marul mildiyö: Tarla devresinde hastalığın çevrede görülmESİ ile uygulamaya başlanmalı ve birer hafta aralarla hasattan en az bir hafta öncesine kadar devam edilmelidir.

Ispanak mildiyösü: İlaçlamaya hastalık koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. 2. ve 3. ilaçlama ilaçın etki süresi dikkate alınarak 10 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Domates (sera) ve biber (sera) çökerten ve fide kök çürüklüğü: İlaçlamaya fidelerin dikiminden hemen sonra, ikinci ilaçlama ise ilk ilaçlamadan 15 gün sonra; damla sulama ile yapılır.



Orvego®

Süsponsiyon Konsantre (SC)

Grubu	C8:45	H5:40	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	-------	-------	----------------------------

300 g/l Ametoctradin + 225 g/l Dimethomorph

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz. Ürünün bulaştığı giysileri çıkarın.

Solunursa; hastayı sakınleştirin, açık havaya çıkarın, tıbbi yardım isteyin.

Deri ile temas ederse; hemen su ve sabun ile iyice yıkayın, tıbbi yardım çağırın. Cilt tahrizi ya da ciltte döküntü olur ise, sağlık desteği alın.

Göz ile temas ederse; derhal etkilenen gözü gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akar su altında yıkayın.

Yutulursa; derhal ağızı su ile çalkalayın ve ardından 1-2 bardak su için, kendinizi iyi hissetmiyorsanız Zehir Merkezi'ne ya da doktora başvurun.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidot yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yer üstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayın.
- Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için ilgili önerilere mutlaka uyunuz.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile ilaçın fizikal, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı olabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeziz.

Eda Sardaş

Ruhsatlandırma Uzmanı

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mersis No: 0143002384900015 Sicil No: 103411-0
Barbaros Mah. Begonya Sk. Niddakule Ataşehir Bat
No: 1 İç Kapı No: 48 34746 Ataşehir / İstanbul
Büyük Mükellef V.D. 1430023849

A
S.0
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MİLYONU
KARTEK EKI

12 Eylül 2024

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Orvego® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 45 / 40 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Orvego®'yu aynı üretim sezonu içerisinde üst üste en fazla iki defa uygulayınız ve toplamda üç uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 45 / 40 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABILİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.

KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ.

Orvego®

Süsponsiyon Konsantre (SC)

Grubu	C8:45	H5:40	Fungisit (Mantar ilacı)
--------------	--------------	--------------	------------------------------------

300 g/l Ametoctradin + 225 g/l Dimethomorph
ÜRETİCİ FİRMA

BASF SE Carl-Bosch-Strasse: 38
67056 Ludwigshafen, Almanya

ÜRETİM YERİ

BASF Espanola S.L Carretera N-340 km 1.156
43006 Tarragona / İspanya

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule
Ataşehir Batı No:1 D:48 34746 Ataşehir - İstanbul
Tel: 0216 5703400 Fax: 0216 5703779

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

® BASF firmasının tescilli markasıdır.

Eda SARDAS
Ruhsatlandırma Uzmanı

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: 0143002384900015 Sicil No: 103411-0
Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule Ataşehir Batı
No:1 İç Kapı No: 48 34746 Ataşehir / İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 1430023849



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL
KARULEDEME

12 Eylül 2024