

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 30.12.2010 / 8158

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki veya Kullanım Alanının Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Kullanım Dozu ve Dönemi	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Kanola	Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Yabani yulaf (<i>Avena fatua</i>) Yumuşak başaklı kuşyemi (<i>Phalaris paradoxa</i>) Kendi gelen buğday (<i>Triticum aestivum</i>)	150 ml/dekar Çıkış sonrası, yabancı otların kardeşlenme dönemi öncesi	35 gün
Pamuk	Köpekdişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	200 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası	-
	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>)	100 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası	-
Soya	Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>)	100 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası	-
Ayçiçeği	Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Yumuşak başaklı kuşyemi (<i>Phalaris paradoxa</i>)	100 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası	-
Şeker Pancarı	Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Çatal otu (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	100 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası	-
Nohut	Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Kendi gelen buğday (<i>Triticum aestivum</i>) Kendi gelen arpa (<i>Hordeum vulgare</i>)	100 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası	-
Mercimek	Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Küçük başaklı kuşyemi (<i>Phalaris minor</i>) Kendi gelen buğday (<i>Triticum aestivum</i>)	100 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası	-
Soğan	Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Kısa başaklı kuşyemi (<i>Phalaris brachystachys</i>)	100 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası	28 gün
Domates	Köpek dişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	200 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası	-
Patates	Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	100 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası	-
Havuç	Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	100 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası	-



Stratos®

Emülsiyon konsantre (EC)

Grubu	1	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	---	-----------------------------

100 g/L Cycloxydim

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik, göz ve ciltte tahriş.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

24 Eylül 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

Net Miktarı : 1 L e
Azami Perakende Satış Fiyatı :

1/3

İÇİNDEKİLER:

Cycloxydim, Solvent Naphtha

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ:
TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

- H304 Yutulduğunda veya solunum yoluyla girdiğinde ölümcül olabilir.
H315 Cilt tahrişine neden olur.
H319 Ciddi göz hasarına neden olur.
H336 Uyuşukluğa veya baş dönmesine neden olabilir.
H361d Doğmamış çocuğa zarar verme şüphesi vardır.
H411 Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için zehirlidir.

ÖNLEM İFADELERİ:

- P202 Güvenlikle ilgili önlemlerin tamamı okunup anlaşılmadan eleçlemeyin.
P261 Buğusunu solumaktan kaçınınız.
P264 Kullanım sonrası vücudun kirlenmiş kısımlarını iyice yıkayınız.
P280 Koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/maske kullanınız.
P391 Döküntüyü bir araya toplayınız.
P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: 014300238490015 Sicil No: 103411-0
Barbaros Mah. Begenya Sk. Midakule Ataşehir Bah
No:1 İç Kapı No: 48 34746 Ataşehir / İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 1430023849

Yerfıstığı	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	200 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası)-
Fasulye	Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Kendi gelen arpa (<i>Hordeum vulgare</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>)	100 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası	28 gün
Ispanak	Kendi gelen arpa (<i>Hordeum vulgare</i>) Kendi gelen buğday (<i>Triticum aestivum</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>)	100 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası	28 gün
Macar Fıđı	Püsküllü çayır (<i>Bromus tectorum</i>) Kendi gelen buğday (<i>Triticum aestivum</i>)	100 ml/da + 100 ml/da Zillion Çıkış sonrası	-



Stratos®

Emülsiyon konsantre (EC)

Grubu	1	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
--------------	----------	--

100 g/L Cycloxydim

Stratos®, yukarıdaki listede olan dar yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan sistemik bir ilaçtır. En uygun uygulama zamanı, daha otların küçük olduđu ve kültür bitkisi ile rekabete başlamadan önceki dönemidir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĐİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

İlk yardım personeli kendi güvenliklerine dikkat etmelidir. Hasta bilincini kaybedecek gibi olursa, yan yatırınız ve bu durumda taşıyınız. Ürünün bulaştığı giysileri derhal çıkarın.

Solunursa; hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, rahat nefes alabileceği pozisyonda dinlenmesini sağlayın, tıbbi yardım isteyin.

Deri ile temas ederse; derhal bol su ve sabun ile yıkayın, deri tahrişi olursa, doktora başvurun.

Göz ile temas ederse; derhal etkilenen gözü birkaç dakika dikkatlice su ile yıkayın, varsa kontak lensleri çıkarın. Yıkamaya 15 dakika devam edin, göz tahrişi uzun süreli ise Zehir Merkezi ya da göz doktoruna danışın.

Yutulursa; derhal ağzı su ile çalkalayın ve ardından 1-2 bardak su için, derhal Zehir Merkezine ya da doktora başvurun, kusturmayınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

2/3 KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yer üstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- İyi havalandırılan ortamda, sıkıca kapalı kaptta ve kilit altında muhafaza edin.
- Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: 0143002384903015 Sicil No:103411-0
Barbaros Meh. Beğonya Sk. Nidakule Ataşehir Batı
No:1 İç Kapı No: 48 34746 Ataşehir / İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 1430023849



TARIM VE ORMAN BAKANLIĐI
GIDA VE İÇİŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĐÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

24 Eylül 2024

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Stratos® hızlı bir şekilde yapraklardan alınarak, yabancı otların büyüme noktalarına taşınır, gövde ve kök dokularının bozulmasına neden olur. Yabancı otların tamamen ölümü hava koşullarına bağlı olarak 2-4 hafta sürebilir. Uygulama yapıldıktan 2 saat sonraki yağacak yağmurlardan etkilenmez. Stratos®, yabancı otların 2-4 yapraklı veya kardeşlenme öncesi döneminde dekara 20-40 litre su ile uygulanmalıdır. Uygulamalar esnasında yelpaze tipi meme kullanılması tavsiye edilir.

Eğer Stratos®, uygulamasından sonra herhangi bir nedenle tarla bozularak başka bir ürün ekilecek olunursa aşağıdaki önerilere uyulmalıdır:

1 hafta sonra: Fasulye, bezelye, şeker pancarı, kanola, karalahana, şalgam, havuç, üğgül ve yonca ekilebilir.

4 hafta sonra: Fransız fasulyesi ekilebilir.

8 hafta sonra: Buğday, arpa ve mısır ekilebilir.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

Stratos® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Stratos®'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karışımı tavsiye edilmez. Diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılması durumunda zararlı etkiler oluşabilir.



Stratos®

Emülsiyon konsantre (EC)

Grubu	1	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
--------------	----------	--

100 g/L Cycloxydim

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

© BASF firmasının tescilli markasıdır.

ÜRETİCİ FİRMA ve ÜRETİM YERİ:

BASF SE Carl-Bosch-Strasse: 38
67056 Ludwigshafen, Almanya

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule
Ataşehir Batı No:1 D:48 34746 Ataşehir - İstanbul
Tel: 0216 5703400 Fax: 0216 5703779

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: 0143002384900015 Sicil No:103411-0
Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule Ataşehir Batı
No:1 İç Kapı No: 48 34746 Ataşehir / İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 1430023849

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

N. Arıcan
Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

24 Eylül 2024