

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 13.03.2020/11607

KULLANILACAKI BİTKİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu
Domates (Sera)	Tütün Beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	50 ml/100 L su (larva, pupa, ergin)
	Çiçek Tripsi (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	50 ml/100 L su (larva, ergin)
Patlıcan (Sera)	Tütün Beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	50 ml/100 L su (larva, pupa, ergin)
	Çiçek Tripsi (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	50 ml/100 L su (larva, ergin)
Biber (Sera)	Tütün Beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	50 ml/100 L su (larva, pupa, ergin)
	Çiçek Tripsi (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	50 ml/100 L su (larva, ergin)
Çilek (Tarla)	Çiçek Tripsi (<i>Frankliniella occidentalis, F. intonsa</i>)	50 ml/da (larva, ergin)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaç su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaç su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamız.



Velifer®

Yağda dağılılabilen (OD)

Grubu	-	Biyolojik İnsektisit (Böcek ilacı)

Beauveria bassiana PPRI 5339 ırkı >8.0x10⁹ cfu/ml

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya bir gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Bilinen bir zehirlenme belirtisi yoktur. Mikroorganizmalar, duyarlaştırmacı reaksiyonlara yol açabilir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

18 -10- 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.


Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER

Beauveria bassiana PPRI 5339 ırkı

ZARARLILIK İŞARETLERİ

Sınıflandırılmamıştır.

UYARI KELİMESİ

Sınıflandırılmamıştır.

ÖNLEM İFADELERİ

- P280 Koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/maske kullanın.
- P501 İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.
- EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Hazırlar hazırlamaz hemen kullanınız.
- Doğal su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını başka amaçlarla kullanmayınız.
- Ürünü sıcaktan ve direkt güneşten koruyunuz. Donmaya karşı korunaklı şekilde depolayınız. 2 °C'nin altındaki ve 25 °C'nin üstündeki sıcaklıklarda saklamayınız.
- İlaçlamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.

Eda SARDAŞ
Ruhsatlandırma Uzmanı

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: 0142002334900015 Sicil No:103411-0
Ezine Mah. Beğonya Cd. MİDAKULE AÇIKGÖR SOK.
No:1 İç Kapı No:48 34745 Ataşehir / İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 1430023349

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Domates, Patlıcan, Biberde Tütün Beyazsineği (Sera): Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Domates, Patlıcan, Biberde Çiçek Tripsi (Sera): Küçük yapraklı bitkilerde bir dekarda tesadüfen 25 bitki ve her bitkiden 2'şer yaprak, büyük yapraklı bitkilerde ise 25 bitkiden 1'er yaprak alınır ve binoküler altında çiçek tripsi ergin ve larvaları sayılır. Yine her bitkiden tesadüfen alınan 2'şer çiçek, bir tepsi içinde beyaz bir kâğıda silkelenecek şekilde alınır ve düşen çiçek tripsi larva ve erginleri sayılır. Yaprak başına düşen çiçek tripsi sayısı (ergin+larva) küçük yapraklı bitkilerde 10, büyük yapraklı bitkilerde 20 adet ise mücadele yapılır.

Çilekte Çiçek Tripsi (Taria): Çilek tarlası farklı yönlerde rasgele gezilerek en az 100 çiçek kontrol edilir. En erkenci çeşidin çiçeklenmesinden itibaren haftada en az 1-2 kez kontroller yapılmalı ve örnekleme tüm çeşitlerde çiçekler açınca kadar devam etmelidir. Popülasyon yoğunluğu ortalama 10 trips/çiçek olduğunda uygulama yapılır. Uygulama, polinatör faaliyetinin en az olduğu çiçeklenme öncesinde veya bitkilerin %10'u çiçek açmadan önce yapılmalıdır.

KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ.**KARIŞABİLİRLİK DURUMU**

Diger bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz

**Velifer®****Yağda dağılılabilen (OD)**

Grubu	-	Biyolojik İnkstisit (Böcek ilacı)
--------------	---	--

Beauveria bassiana PPRI 5339 ırkı >8.0x10⁹ cfu/ml**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ**

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Ürünün bulaştığı giysileri çıkarın.

Solunursa; hastayı sakınleştirin, açık havaya çıkarın.

Deri ile temas ederse; su ve sabun ile iyice yıkayın.

Göz ile temas ederse; etkilenen gözleri gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akar su altında yıkayın.

Yutulursa; ağızınızı su ile çalkalayın ve sonra 1-2 bardak su için.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

© BASF firmasının tescilli markasıdır.



18 -10- 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında en az 12 ay süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesi firmamızın garantisi altındadır. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul edilmez.

ÜRETİCİ FİRMA

BASF Corporation
North America Regional Headquarters 100 Park Avenue
Florham Park, New Jersey 07932, ABD

ÜRETİM TESİSİ

BASF Agricultural Specialities (Pty) Ltd.
Giba Gorge Business Park Ingweni Road,
Mahogany Ridge 3610 Güney Afrika

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule
Ataşehir Batı No:1 D:48 34746 Ataşehir - İstanbul
Tel: 0216 5703400 Faks: 0216 5703779

Eda SARDAŞ
Ruhsatlandırma Uzmanı

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: 0142002334990015 Sicil No:103411-0
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Mah. / Ataşehir / İstanbul
Tic. Sicil No: 48 34746 Ataşehir / İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 1430023849